


Con al menos **1** de los siguientes criterios, de intolerancia o resistencia a la hidroxiurea es necesario cambiar a segunda línea de tratamiento de Policitemia Vera de acuerdo a las guías de ELN 2021.^{1,2}



Resistencia


Al menos 3 meses con HU a dosis de 2 gr/día



1 Necesidad de flebotomías para mantener menos de 45% de hematocrito.



2 Falla para reducir la esplenomegalia al menos 50%.



3 Falla para mejorar los síntomas asociados a la esplenomegalia



4 **Mieloproliferación**
Leucocitos $>10 \times 10^9$ /Células/L
Plaquetas $>400 \times 10^9$ /Células/L.

Intolerancia



5 **Citopenias:**
Leucocitos 10×10^9 /Células/L
Plaquetas 100×10^9 /Células/L
Hemoglobina 10 g/dL con la menor dosis para obtener respuesta clínico hematológica.



6 Trombosis o hemorragia pese a tratamiento.



7

- Úlceras mucocutáneas
- Manifestaciones gastrointestinales o neumonitis o fiebre asociada al tratamiento.
- Cáncer de piel no melanoma.

Referencia:

1. Br J Haematol. 2016 Feb;172(3):337-49.

2. Marchetti, M. et al. Lancet Haematol 2022; 9: e301-11

Material exclusivo para el profesional de la salud.

Content ID: FA-11302121 Fecha de Expiración: 07 NOVIEMBRE 2026